

MacTSQ

Les questions suivantes portent sur la façon dont vous avez vécu le traitement reçu pour votre dégénérescence maculaire. La dégénérescence maculaire peut causer une perte de la vision centrale.

Le traitement de vos yeux peut comporter :

- des médicaments (p. ex., comprimés, gouttes pour les yeux);
- des visites à une clinique ophtalmologique ou chez un ophtalmologiste pour des examens;
- des visites à une clinique ophtalmologique ou chez un ophtalmologiste pour des traitements.

En répondant à ce questionnaire, veuillez :

- considérer le traitement reçu récemment pour votre dégénérescence maculaire;
- considérer le traitement reçu pour votre dégénérescence maculaire et non pour d'autres troubles oculaires que vous pourriez avoir, comme la myopie, la presbytie, l'hypermétropie ou des cataractes;
- répondre à chacune des questions en faisant un « X » à côté de l'un des chiffres allant de 6 à 0 (ou parfois de 7 à 0).

1. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) du traitement reçu pour votre dégénérescence maculaire?

- 6 très satisfait(e) 6
- 5 5
- 4 4
- 3 3
- 2 2
- 1 1
- 0 très insatisfait(e) 0

2. Dans quelle mesure êtes-vous incommodé(e) par des effets secondaires ou des effets tardifs du traitement reçu pour votre dégénérescence maculaire?

- 7 aucun effet ressenti 7
- 6 pas du tout incommodé(e) ... 6
- 5 5
- 4 4
- 3 3
- 2 2
- 1 1
- 0 très incommodé(e) 0

This copy is for information only - for use, please contact Professor Bradley